



DUPIXENT®-Fertigspritze* richtig anwenden

Lesen Sie vor der Anwendung von DUPIXENT® die Packungsbeilage gründlich durch, denn sie enthält weitere wichtige Hinweise für Sie. Diese Anwendungskarte ist nur als Gedächtnisstütze zu verwenden, wenn Ihnen die zusätzlichen wichtigen Hinweise aus der Packungsbeilage bekannt sind.



1. Warten Sie, bis die Fertigspritze Raumtemperatur angenommen hat.


Lassen Sie die Fertigspritze nach der Entnahme aus dem Kühlschrank auf einer ebenen Oberfläche liegen, bis sie Raumtemperatur angenommen hat. Die Wartezeit hängt von Ihrer verordneten Dosis ab. Warten Sie mindestens 30 Minuten bei einer Dosis von 200 mg, und mindestens 45 Minuten bei einer Dosis von 300 mg.



2. Auswahl der Injektionsstelle


- Bei Selbstinjektion: Oberschenkel, Bauch (Unterbauch), außerhalb eines Umkreises von 5 cm um Ihren Bauchnabel herum.
- Injektion nur durch eine Pflegeperson: Injektion auch in die Außenseite des Oberarms möglich.

Wechseln Sie die Injektionsstelle bei jeder Injektion. Injizieren Sie nicht in empfindliche, verletzte oder vernarbte Hautstellen oder in Hautstellen mit blauen Flecken.




3. Waschen Sie Ihre Hände und desinfizieren Sie die Haut an der Injektionsstelle mit einem Alkoholtupfer.

Lassen Sie die Haut an der Injektionsstelle trocknen, bevor Sie injizieren.




4. Ziehen Sie die Nadelschutzkappe ab.

Injizieren Sie DUPIXENT® direkt, nachdem Sie die Nadelschutzkappe abgezogen haben.




5. Drücken Sie die Haut an der Injektionsstelle zusammen, sodass sich eine Hautfalte bildet.


*mit automatischem Sicherheitssystem



DUPIXENT®-Fertigspritze* richtig anwenden




6. Führen Sie die Nadel in einem Winkel von etwa 45° vollständig in die Hautfalte ein.



7. Drücken Sie den Kolben nach unten.

Lassen Sie die zusammengedrückte Haut los. Drücken Sie den Spritzenkolben langsam und gleichmäßig ganz nach unten, bis der Kolben stoppt und die Spritze leer ist.



8. Lassen Sie den Kolben los.

Heben Sie Ihren Daumen, um den Spritzenkolben freizugeben, bis die Nadel von dem automatischen Sicherheitssystem umschlossen ist, und entfernen Sie anschließend die Fertigspritze von der Injektionsstelle. Falls Sie etwas Blut sehen, drücken Sie ein Stück Watte oder Gaze behutsam auf die Injektionsstelle.



9. Entsorgung

Entsorgen Sie die Fertigspritze und die Nadelschutzkappe in einem durchstichsicheren Behältnis.

*mit automatischem Sicherheitssystem

Weiterführende Informationen zu DUPIXENT® finden Sie in der DUPIXENT®-Packung beiliegenden Gebrauchsinformation, unter www.mein.sanofi.de/produkte/Dupixent oder wenden Sie sich an unser Service-Team von *Aktiv mit schwerem Asthma* telefonisch unter **0800 50 500 20** oder per E-Mail an service@aktiv-mit-schwerem-asthma.de.