



## ERLÄUTERUNGEN ZUR IGA-CPG-S-DOKUMENTATION

### IGA-CPG-S: INVESTIGATOR'S GLOBAL ASSESSMENT FOR STAGE OF CHRONIC PRURIGO<sup>1</sup> Instrument zur Bewertung des allgemeinen Schweregrads der chronischen Prurigo bzw. chronisch nodulären Prurigo (CNPG)

Bei der Gesamtbeurteilung der Prurigo nodularis\* wird der gesamte Hautzustand des Patienten<sup>#</sup> bewertet, zur Einschätzung des Schweregrads werden pruriginöse Hautläsionen und Knoten herangezogen.

IGA		
Grad	Kategorie	Beschreibung: Stadium (IGA-CPG-S)
0	Keine	Keine pruriginösen Hautläsionen (0 Läsionen)
1	Minimal	Einzelne tastbare pruriginöse Hautläsionen (etwa 1 – 5 Läsionen)
2	Mild	Wenige tastbare pruriginöse Hautläsionen (etwa 6 – 19 Läsionen)
3	Moderat	Viele tastbare pruriginöse Hautläsionen (etwa 20 – 100 Läsionen)
4	Schwer	Reichlich tastbare pruriginöse Hautläsionen (über 100 Läsionen)



## ERLÄUTERUNGEN ZUR WI-NRS-DOKUMENTATION

### WI-NRS: WORST ITCH NUMERIC RATING SCALE<sup>2,3</sup> Instrument zur Bewertung des Schweregrades des Pruritus

Bei der Beurteilung des Pruritus wird die subjektive Wahrnehmung des Patienten während der letzten 24 Stunden auf einer Skala von 0 (kein Pruritus) bis 10 (schlimmster vorstellbarer Pruritus) bewertet.



NRS				
0 = kein Pruritus	< 3 = leichter Pruritus	≥ 3 – < 7 = moderater Pruritus	≥ 7 – < 9 = schwerer Pruritus	≥ 9 = sehr schwerer Pruritus

\* Prurigo nodularis (chronisch noduläre Prurigo; PN)

<sup>#</sup> Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die gleichzeitige Verwendung geschlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten aber selbstverständlich für alle Geschlechter.

<sup>1</sup> Zeidler C et al. Acta Derm Venereol 2021; 101(2):adv00401; <sup>2</sup> Phan NQ et al. Acta Derm Venereol 2012; 92:502–507; <sup>3</sup> Verweyen E et al. Acta Derm Venereol 2019;99:657–666.

Name des Patienten

Datum



## IGA-CPG-S - INVESTIGATOR'S GLOBAL ASSESSMENT FOR STAGE CHRONIC PRURIGO<sup>1</sup>

### Wie viele Prurigoläsionen sind vorhanden?

Bitte zählen Sie die ersten 20 tastbaren Prurigoläsionen. Sobald mehr als 20 Prurigoläsionen vorhanden sind, wird empfohlen zu schätzen. Abgeheilte Läsionen und Narben nicht berücksichtigen.

IGA 0	keine tastbaren Läsionen	<input type="checkbox"/>
IGA 1	minimal 1 - 5 tastbare Läsionen	<input type="checkbox"/>
IGA 2	mild 6 - 19 tastbare Läsionen	<input type="checkbox"/>
IGA 3	moderat 20 - 100 tastbare Läsionen	<input type="checkbox"/>
IGA 4	schwer > 100 tastbare Läsionen	<input type="checkbox"/>



## WI-NRS - WORST ITCH NUMERIC RATING SCALE<sup>2,3</sup>

Bitte befragen Sie Ihren Patienten:

**Auf einer Skala von 0 (kein Jucken) bis 10 (schlimmstes vorstellbares Jucken), wie würden Sie Ihren schlimmsten Juckreiz innerhalb der letzten 24 Stunden bewerten?**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kein Pruritus										Am schlimmsten vorstellbarer Pruritus

NRS				
0 = kein Pruritus	< 3 = leichter Pruritus	≥ 3 - < 7 = moderater Pruritus	≥ 7 - < 9 = schwerer Pruritus	≥ 9 = sehr schwerer Pruritus

<sup>1</sup> Zeidler C et al. Acta Derm Venereol 2021; 101(2):adv00401; <sup>2</sup> Phan NQ et al. Acta Derm Venereol 2012; 92:502-507; <sup>3</sup> Verweyen E et al. Acta Derm Venereol 2019;99:657-666.